



# Circus aeruginosus

(LINNAEUS, C 1758)



- REGNO ANIMALIA
- PHYLUM CHORDATA
- CLASSE AVES
- ORDINE ACCIPITRIFORMES
- FAMIGLIA ACCIPITRIDAE

## CARTA D'IDENTITÀ

**IL FALCO DI PALUDE** È UN GRANDE RAPACE DIURNO COMUNE NELLE ZONE UMIDE. È FACILE OSSERVARLO IN CACCIA MENTRE VOLA A BASSA QUOTA SOPRA LE BARENE E I CANNETI.

### • DIMENSIONI

LUNGHEZZA MASSIMA: 48-56 cm  
APERTURA ALARE: 120-135 cm

### • DISTRIBUZIONE

EUROPA E ASIA SETTENTRIONALE. IN ITALIA È SPECIE SEDENTARIA E NIDIFICANTE, MIGRATRICE REGOLARE E SVERNANTE. COMUNE SOPRATTUTTO LUNGO LE COSTE SETTENTRIONALI ADRIATICHE E NELLE AREE INTERNE DELLA PIANURA PADANA.

### • PERIODO RIPRODUTTIVO (in Veneto)

### • STATO DI CONSERVAZIONE\*

\* Lista rossa italiana IUCN

G F M A M G L A S O N D

RISCHIO MINIMO	PROSSIMO ALLA MINACCIA	<b>VULNERABILE</b>	IN PERICOLO	IN PERICOLO CRITICO	ESTINTO IN NATURA	ESTINTO
----------------	------------------------	--------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------

## ECOLOGIA

SPECIE TENDENZIALMENTE SOLITARIA. NIDIFICA IN ZONE UMIDE, ANCHE SALMASTRE, SIA COSTIERE CHE INTERNE, PURCHÉ RICCHE DI FITTA VEGETAZIONE, SOPRATTUTTO A CANNETO. DURANTE LA MIGRAZIONE E LO SVERNAMENTO FREQUENTA ANCHE AREE COLTIVATE E MARGINI DI ZONE BOSCOSE FINO A QUOTE SUPERIORI AI 2000 m. NIDIFICA A TERRA, SPESSO NELLE VICINANZE DELL'ACQUA, DOVE È PIÙ FITTA LA VEGETAZIONE, CON COVATE MEDIE DI 3-6 UOVA. È UN PREDATORE ALQUANTO GENERALISTA LA CUI DIETA SI COMPONE PREVALENTEMENTE DI UCCELLI ACQUATICI E PICCOLI MAMMIFERI. IL COMPORTAMENTO IN CACCIA È CARATTERISTICO: È FACILE OSSERVARLO IN VOLO APPENA SOPRA LA VEGETAZIONE, MENTRE ESEGUE LUNGHE PLANATE SEGUITE DA STOP IMPROVVISI PRIMA DI TUFFARSI SULLA PREDA, O MENTRE VOLA IN QUOTA SFRUTTANDO LE CORRENTI TERMICHE.

### IN LAGUNA DI VENEZIA

DURANTE I MESI INVERNALI LA POPOLAZIONE STANZIALE LAGUNARE SI ACCRESCE DEGLI INDIVIDUI MIGRATORI PROVENIENTI DALLE REGIONI SETTENTRIONALI EUROPEE. NEL VENEZIANO È COMUNE L'OSSERVAZIONE DELLA SPECIE NELLE AREE DI BARENA, NELLE VALLI DA PESCA E NEGLI AMBIENTI UMIDI CON PRESENZA DI SPECCHI D'ACQUA LUNGO LA GRONDA LAGUNARE E DELL'ENTROTERRA. PER LA SUA SOMIGLIANZA ALLA POIANA, È CHIAMATO LOCALMENTE PÒIA DE VÀE.

### RICONOSCERE LA SPECIE

È UN RAPACE DI MEDIE DIMENSIONI, SIMILE AD UNA POIANA MA DALLA FORMA PIÙ SNELLA, CON CODA E ALI PIÙ LUNGHE E TESTA PIÙ PICCOLA. IN VOLO È RICONOSCIBILE PER LA FORMA DELLE ALI, A BORDI QUASI RETTILINEI E SOLO 5 PENNE REMIGANTI BEN DISTINGUIBILI, PER LA CODA ALQUANTO SOTTILE E DALL'ESTREMITÀ LEGGERMENTE ARROTONDATA, E PER LE ALI TENUTE A V DURANTE LE PLANATE. QUEST'ULTIMO CARATTERE LO DISTINGUE DA ALBANELLE E POIANE. NEL MASCHIO ADULTO IL PIUMAGGIO PRESENTA DIVERSE COLORAZIONI: MARRONE SU DORSO E SPALLE; BRUNO ROSSICCO SULLE PARTI INFERIORI E GRIGIO CENERE SULLE ALI. PRESENTA STRIATURE GIALLASTRE SUL CAPO. LA FEMMINA, DI DIMENSIONI MAGGIORI, HA INVECE UNA COLORAZIONE MARRONE PIÙ UNIFORME CON TESTA, GOLA E SPALLE COLOR CREMA. I GIOVANI SONO PIÙ SIMILI ALLA FEMMINA PER VARIABILITÀ CROMATICA. QUANDO È POSATO ASSUME COMUNEMENTE UNA POSIZIONE ABBASTANZA ORIZZONTALE, CON LE PUNTE DELLE ALI CHIUSE CHE RAGGIUNGONO L'ESTREMITÀ DELLA CODA.

## A PROPOSITO DI...



### COMPORTEMENTO

DURANTE LA NIDIFICAZIONE LA FEMMINA, IMPEGNATA NELLA COVA, ATTENDE CHE IL MASCHIO LE PORTI IL CIBO CATTURATO. IL PASSAGGIO DELLA PREDA TRA I DUE INDIVIDUI AVVIENE IN VOLO, CON UN RITUALE MOLTO CARATTERISTICO.

