



# Ardea cinerea

LINNAEUS, 1758



- REGNO ANIMALIA
- PHYLUM CHORDATA
- CLASSE AVES
- ORDINE PELECANIFORMES
- FAMIGLIA ARDEIDAE

## CARTA D'IDENTITÀ

**L'AIRONE CENERINO** È IL PIÙ COMUNE E ABBONDANTE DEGLI AIRONI, INCONFONDIBILE PER DIMENSIONI E COLORE DELLA LIVREA, DA CUI PRENDE IL NOME.

### • DIMENSIONI

LUNGHEZZA: 90 cm  
APERTURA ALARE: 150-160 cm

### • DISTRIBUZIONE

DIFFUSA IN EURASIA E AFRICA. IN ITALIA È SPECIE PARZIALMENTE SEDENTARIA E NIDIFICANTE, MIGRATRICE REGOLARE E SVERNANTE.

### • PERIODO RIPRODUTTIVO (nidificazione, in Veneto)

G F M A M G L A S O N D

### • STATO DI CONSERVAZIONE\*

\*Lista rossa italiana IUCN



## ECOLOGIA


L'AIRONE CENERINO È UN UCCELLO DALLA SPICCATATA ADATTABILITÀ, SIA PER QUANTO RIGUARDA LA SCELTA DELL'HABITAT, SIA DAL PUNTO DI VISTA DELLA DIETA. UTILIZZA UN'AMPIA VARIETÀ DI AMBIENTI UMIDI O IN PROSSIMITÀ DI ESSI. TRA QUESTI VI SONO I CORSI D'ACQUA, ANCHE ARTIFICIALI, E LE AREE AGRICOLE E PERIURBANE LIMITROFE; GLI SPECCHI D'ACQUA DOLCE E LE ZONE UMIDE COSTIERE. LA DIETA RIFLETTE TALE PLASTICITÀ IN QUANTO DIPENDE DALL'HABITAT FREQUENTATO, E PUÒ ESSERE COSTITUITA DA INVERTEBRATI E PICCOLI VERTEBRATI. TRA QUESTI ULTIMI VI SONO PESCI, ANFIBI, RETTILI E PERFINO PICCOLI MAMMIFERI E GIOVANI UCCELLI. L'HABITAT RIPRODUTTIVO PREFERENZIALE È COSTITUITO DA NUCLEI BOSCATI IN PROSSIMITÀ DI ZONE UMIDE, NEI QUALI SI RIUNISCE IN COLONIE CHIAMATE GARZAIE. NIDIFICA SOLITAMENTE SU ALBERI E ARBUSTI, MA IN CERTI CONTESTI PUÒ UTILIZZARE ANCHE IL CANNETO, SEMPRE IN POSIZIONE SOPRAELEVATA RISPETTO ALL'ACQUA. ANCHE DURANTE L'INVERNO È POSSIBILE OSSERVARLO RAGGRUPParsi IN POSATOI COMUNI, A TERRA DURANTE IL GIORNO E SUGLI ALBERI DI NOTTE.

## IN LAGUNA DI VENEZIA

È UNA SPECIE MOLTO COMUNE IN LAGUNA E NEL TERRITORIO CIRCOSTANTE, CON POPOLAZIONI PROGRESSIVAMENTE IN AUMENTO SIA DURANTE IL PERIODO RIPRODUTTIVO CHE IN INVERNO. VISTE LE PREFERENZE ECOLOGICHE, È PIÙ FREQUENTE RISCONTRARLO IN AMBIENTI IN CUI È PRESENTE CANNETO, ALBERI O ARBUSTI, COME NELLE AREE DELLA GRONDA LAGUNARE, NELLE VALLI DA PESCA E NELLE MOLTE ISOLE MINORI CON VEGETAZIONE INCOLTA. COLONIE DI AIRONE CENERINO SI SONO INSEDIATE, IN PARTICOLARE, IN ALCUNE ISOLE ABBANDONATE E OCCUPATE DA DENSII NUCLEI ALBERATI. L'AIRONE CENERINO, IN DIALETTO VENEZIANO, È CHIAMATO SGÀRSO SÉNARE O PIÙ GENERALMENTE AIRÓN.

## RICONOSCERE LA SPECIE

AIRONE DI TAGLIA MEDIO GRANDE E DI ASPETTO ROBUSTO. LA LIVREA È PREVALENTEMENTE GRIGIA SU DORSO E ALI, E GRIGIO-BIANCASTRA SU PETTO E PARTI INFERIORI. LA PARTE SUPERIORE DELLE ALI PORTA PENNE REMIGANTI E COPRITRICI PRIMARIE NERE. LA TESTA È DI COLORE PREVALENTEMENTE BIANCO, CON UNA FASCIA NERA AI LATI E SULLA NUCA. IL BECCO È LUNGO E ROBUSTO DI COLORE GRIGIO-GIALLO. NON È PRESENTE DIMORFISMO SESSUALE. PORTA IL LUNGO COLLO IN POSIZIONE RETRATTA DURANTE IL VOLO E SPESSO ANCHE A RIPOSO. È BEN DISTINGUIBILE DALLE ALTRE DUE SPECIE DI GRANDI AIRONI PER COLORE E TAGLIA: L'AIRONE BIANCO MAGGIORE È COMPLETAMENTE CANDIDO; L'AIRONE ROSSO È LEGGERMENTE PIÙ PICCOLO E SNELLO.



## A PROPOSITO DI...



### COMPETIZIONE INTERSPECIFICA

A CAUSA DELLE SIMILI PREFERENZE IN QUANTO AD HABITAT DI NIDIFICAZIONE, L'AIRONE CENERINO PUÒ ENTRARE IN COMPETIZIONE CON IL CORMORANO, ALTRA SPECIE IN VISTOSO AUMENTO NUMERICO LUNGO IL LITORALE NORD ADRIATICO.



### VERSI E RICHIAMI

UNA GRACCHIANTE CANTILENA È IL RICHIAMO UDIBILE AL CREPUSCOLO, PROVENIENTE DAGLI INDIVIDUI IN VOLO VERSO I DORMITORI.