



# Artemisia caerulescens

LINNAEUS



- REGNO PLANTAE
- CLADE EUDICOTILEDONI
- ORDINE ASTERALES
- FAMIGLIA ASTERACEAE

## CARTA D'IDENTITÀ

**L'ASSENZIO LITORALE** È UNA SPECIE ERBACEA CARATTERISTICA DELLE AREE COSTIERE E SALMASTRE, DAL TIPICO E INTENSO ODORE DI VERMUT.

### • DIMENSIONI

ALTEZZA: 30-80 cm

### • FIORITURA

G F M A M G L A S O N D

### • DISTRIBUZIONE

EURIMEDITERRANEA. È UNA SPECIE TIPICA DELL'EUROPA MEDITERRANEA; IN ITALIA CRESCE LUNGO LE COSTE DELLA PENISOLA E DELLA SARDEGNA.

## ECOLOGIA

È UNA SPECIE SUB-ALOFILA, CAPACE DI TOLLERARE UNA MODERATA CONCENTRAZIONE DI SALI NEL SUOLO E NEI TESSUTI, E DI RESISTERE BENE ANCHE A CONDIZIONI DI ARIDITÀ. È PROVISTA INFATTI DI FOGLIE FORTEMENTE TOMENTOSE (RICOPERTE DI PELURIA), CHE CONTRIBUISCONO A RIDURRE LA TRASPIRAZIONE E A LIMITARE QUINDI LA PERDITA D'ACQUA. L'ASSENZIO LITORALE SI TROVA PRINCIPALMENTE IN ZONE COSTIERE SALMASTRE, AL MARGINE DELLE DEPRESSIONI RETRODUNALI IN AMBIENTE LITORANEO, NELLE STEPPE ARIDE O IN AREE CON SUOLI RICCHI DI SALI, SABBIOSI O ARGILLOSI. COLONIZZA TIPICAMENTE I BORDI DELLE AREE PIÙ SALATE E INONDATE, DOVE LASCIA IL POSTO A VEGETAZIONE MAGGIORMENTE ALOFILA.

## IN LAGUNA DI VENEZIA

L'ASSENZIO LITORALE FA PARTE DELLA VEGETAZIONE DELLE BARENE, ISOLOTTI PERIODICAMENTE SOMMERSI E CON ELEVATA SALINITÀ DEL SUOLO. LA SPECIE COLONIZZA LE PORZIONI PIÙ ELEVATE DI QUESTI AMBIENTI, CARATTERIZZATE DA UNA MINORE INONDAZIONE DA PARTE DELLE MAREE E DA UNA MAGGIORE ARIDITÀ. CONDIVIDE QUESTO HABITAT CON ALTRE SPECIE TIPICHE DELLE BARENE, QUALI *Limbarda crithmoides* E *Halimione portulacoides*, MA ANCHE CON SPECIE COSTIERE PIÙ GENERALISTE COME *Juncus acutus* E *Thinopyrum acutum*. IN DIALETTO VENEZIANO È CONOSCIUTA COME SANTÒNEGO.

## RICONOSCERE LA SPECIE

SI TRATTA DI UNA PIANTA PERENNE CESPUGLIOSA, RICOPERTA DA UNA LEGGERA PELURIA SOPRATTUTTO SULLE PARTI GIOVANI. CRESCE SU UNA RADICE PRINCIPALE ROBUSTA (RADICE FITTONANTE) E PRESENTA FUSTI ERETTI, LEGNOSI ALLA BASE E MOLTO RAMIFICATI NELLA PARTE ALTA, DOVE SI SVILUPPANO I FIORI. LE FOGLIE ALLA BASE E SUI RAMI NON FIORIFERI SONO PICCIOLATE E DI FORMA VARIABILE: DA STRETTE E ALLUNGATE A PIÙ LARGHE E ARROTONDATE; SONO TALVOLTA DIVISE IN POCHI SEGMENTI CON PUNTE TONDEGGIANTI E TENDONO A SECCARSI NEL PERIODO DELLA FIORITURA. LE FOGLIE LUNGO I FUSTI FIORIFERI SONO PIÙ SEMPLICI, SENZA PICCIOLO, COPERTE DI PELURIA E LUNGHE CIRCA 20 MILLIMETRI; SONO GRIGIO-AZZURRE, CON NERVATURA CENTRALE VISIBILE; SE STROFINATE, RILASCIANO UN CARATTERISTICO ODORE PUNGENTE, DOVUTO ALLA PRESENZA DI DIVERSI COMPOSTI VOLATILI, TRA CUI LA CANFORA, IL CINEOLO, IL PINENE E IL LIMONENE. I FIORI SONO RIUNITI IN UN'INFIORESCENZA A PANNOCCHIA PIRAMIDALE, Densa. I CAPOLINI, LUNGH 2-3 MILLIMETRI E LARGHI 1-2 MILLIMETRI, SONO OBLUNGH 1,5 MILLIMETRI E PRIVI DI PAPP 1. I FRUTTI SONO PICCOLI ACHENI OVALI E ALLUNGATI, LISCI, LUNGH 1,5 MILLIMETRI E PRIVI DI PAPP 1.



## A PROPOSITO DI...



### PROFUMO

LA PIANTA STROPICCIATA EMANA UN ODORE AROMATICO, TIPICO DI MOLTE SPECIE DI QUESTO GENERE. L'ODORE È LEGGERMENTE AMARO E CON NOTE DI CANFORA E MENTA.

# a

### ETIMOLOGIA

IL NOME DIALETTALE DERIVA DALLA SANTONINA, UNA SOSTANZA ESTRATTA DAI CAPOLINI DELLA PIANTA CHE IN PASSATO VENIVA UTILIZZATA PER LE SUE PROPRIETÀ FEBBRIFUGHE E VERMIFUGHE. CONTIENE INOLTRE TUJONE, UNA SOSTANZA TOSSICA ORIGINARIAMENTE USATA PER PREPARARE L'ASSENZIO: PER QUESTO LA PIANTA VENIVA UTILIZZATA ANCHE PER AROMATIZZARE LA GRAPPA.