




# Tringa totanus

(LINNAEUS, C 1758)



- REGNO ANIMALIA
- PHYLUM CHORDATA
- CLASSE AVES
- ORDINE CHARADRIIFORMES
- FAMIGLIA SCOLOPACIDAE

## CARTA D'IDENTITÀ

**LA PETTEGOLA** È IL TRAMPOLIÈRE PIÙ COMUNE E RICONOSCIBILE DEGLI AMBIENTI COSTIERI E LAGUNARI. NIDIFICA PERLOPIÙ IN COLONIE NUMEROSE, SPESSO ASSIEME AD ALTRE SPECIE.

### • DIMENSIONI

LUNGHEZZA: 24-27 cm  
APERTURA ALARE: 47-53 cm

### • DISTRIBUZIONE

DIFFUSA IN EUROPA, AFRICA SETTENTRIONALE E ASIA. IN ALTO ADRIATICO È SPECIE MIGRATRICE, PARZIALMENTE SEDENTARIA E NIDIFICANTE.

### • PERIODO RIPRODUTTIVO (in Veneto)

G F M **A M G L** A S O N D

### • STATO DI CONSERVAZIONE\*

\* Lista rossa italiana IUCN



## ECOLOGIA

NIDIFICA TRA LA VEGETAZIONE BASSA NELLE PALUDI COSTIERE E INTERNE, NEI PRATI UMIDI E BRUGHIERE. DURANTE LA MIGRAZIONE E LO SVERNAMENTO SI TRATTIENE PERLOPIÙ IN PROSSIMITÀ DELLE COSTE. È UNO DEI TRAMPOLIÈRI PIÙ COMUNI IN GRAN PARTE DELL'AREALE EUROPEO. SI NUTRE DI PICCOLE PREDE, COSTITUITE DA INVERTEBRATI SIA ACQUATICI CHE TERRESTRI, CHE CATTURA CON RAPIDI MOVIMENTI DEL BECCO.

## IN LAGUNA DI VENEZIA

GRAN PARTE DELLA POPOLAZIONE ITALIANA DI PETTEGOLA SI CONCENTRA NELLA LAGUNA DI VENEZIA. QUESTA, ASSIEME AD ALTRI SITI LAGUNARI ALTO ADRIATICI, È UNA DELLE POCHE AREE DI NIDIFICAZIONE DELLA SPECIE IN ITALIA, DOVE ALTRIMENTI SI RINVIENE SOLO DI PASSAGGIO. LA LAGUNA COSTITUISCE QUINDI UN SITO DI RILEVANZA INTERNAZIONALE PER LA NIDIFICAZIONE DELLA SPECIE.

IN NIDIFICAZIONE LA PETTEGOLA SI CONCENTRA IN COLONIE ANCHE DI MOLTI INDIVIDUI, GENERALMENTE PLURISPECIFICHE. SI ASSOCIA SPESSO A STERNE, GABBIANI, CAVALIERI D'ITALIA E AVOCETTE. SOLO UNA PICCOLA PARTE DELLE COPPIE NIDIFICANO ISOLATE. LE BARENE NATURALI SONO IL PRINCIPALE HABITAT DI NIDIFICAZIONE, DOVE LA SPECIE MOSTRA UNA PREFERENZA PER SPECIFICI TIPI DI VEGETAZIONE: DISDEGNA INFATTI LE AREE PIÙ BASSE A SPARTINA E A LIMONIO, MENTRE SEMBRA PREFERIRE LE PORZIONI DI BARENA PIÙ ELEVATE CON VEGETAZIONE LEGNOSA A SALICORNIE PERENNI E HALIMIONE. IN TAL MODO EVITA LE AREE PIÙ FREQUENTEMENTE INONDATE E SELEZIONA I SITI CHE LE CONSENTONO UNA MINORE VISIBILITÀ AI PREDATORI. IN DIALETTO VENEZIANO È CHIAMATA TÒTANO.

## RICONOSCERE LA SPECIE

LIMICOLO DI MEDIE DIMENSIONI, È CARATTERIZZATO DA UNA COLORAZIONE PERLOPIÙ MARRONE-GRIGIO, PIÙ CHIARA VENTRALMENTE. DURANTE L'ESTATE ESIBISCE UNA PUNTEGGIATURA SCURA, SOSTITUITA DA STRIATURE SU VENTRE E SOTTOCODA. L'ABITO INVERNALE È PIÙ SBIADITO, COLORANDOSI PIÙ UNIFORMEMENTE DI GRIGIO CON MACCHIE E STRIATURE MENO EVIDENTI. SUBITO RICONOSCIBILE PER IL BECCO, RELATIVAMENTE ROBUSTO SE CONFRONTATO CON SPECIE SIMILI DI SCOLOPACIDI E DI COLORE ROSSO-ARANCIO CON ESTREMITÀ NERA, E PER LE ZAMPE, ANCH'ESSE ROSSO-ARANCIO. LA SPECIE È BEN RICONOSCIBILE ANCHE IN VOLO PER LA EVIDENTE BARRATURA BIANCA SUL POSTERIORE DELLE ALI.

## A PROPOSITO DI...



### MINACCE

POICHÉ NIDIFICA NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL LIMITE DELL'ALTA MAREA, IL PREVISTO INNALZAMENTO DEL MARE RAPPRESENTA LA PRINCIPALE MINACCIA ALLA PERMANENZA DELLA POPOLAZIONE NIDIFICANTE IN ALTO ADRIATICO.



### VERSI E RICHIAMI

È UN UCCELLO MOLTO ATTIVO, VIGILE E CHIASSOSO, VOCIFERO IN TUTTE LE STAGIONI, ANCHE DI NOTTE NEI DORMITORI.

